



Carugno J, Sardo ADS, Alonso L, et al. **"COVID 19 pandemic. Impact of hysteroscopic procedures. A consensus statement from the Global Congress of Hysteroscopy Scientific Comitee"** *J Minim Invasive Gynecol.* 2020; S1553-4650(20)30211-9

Consens d'experts on s'especifiquen les següents recomanacions per dur a terme procediments histeroscòpics durant la pandèmia de COVID19:

- 1- Indicació: Limitar la realització d'una histeroscòpia a aquelles pacients en les quals retardar el procediment podria implicar un empitjorament clínic
- 2- Triatge: Realitzar un triatge telefònic previ i només permetre acudir a la Unitat de Histeroscòpia pacients i acompanyant amb test COVID19 negatiu (en cas d'haver estat realitzat) i absència de símptomes o d'exposició a COVID19
- 3- Acompanyant: recomanar acudir amb un únic acompanyant de <60 anys només si és estrictament necessari
- 4- Mesures de protecció: Garantir mesures de distanciament mínim de 2 metres, evitar acumulació de pacients a la sala d'espera i fer ús de mascareta quirúrgica durant tota l'estada a la Unitat
- 5- Histeroscòpia a Consulta o *Office*:
 - Es recomana que l'equip mèdic present es limiti al personal estrictament necessari i faci ús d'EPP (vestit, davantal, màscara quirúrgica, ulleres o pantalla i guants)
 - Fer ús de l'equip histeroscòpic que pugui permetre fer el procediment de la manera més ràpida i segura possible
 - Mantenir les mesures estàndard de desinfecció de la consulta entre pacients així com de l'equip de histeroscòpia
 - Realitzar la visita de seguiment post-procediment de forma telemàtica
- 6- Histeroscòpia a Quiròfan:
 - Valorar realitzar test COVID 19 previ
 - Fer ús preferiblement de sedació conscient o anestèsia locoregional per evitar el risc de disseminació viral durant la intubació/extubació
 - Fer ús de l'equip histeroscòpic que pugui permetre fer el procediment de la manera més ràpida i segura possible i, preferiblement utilitge no productor de fum com tisora, pinça o morcelació
 - En cas d'utilitzar electrocirurgia, connectar aspiració contínua al canal de sortida
 - Canviar EPP entre pacients
- 7- En cas de pacients amb infecció COVID19 confirmada i necessitat de cirurgia histeroscòpica urgent, el procediment s'ha de realitzar sota estrictes condicions de protecció idealment en un quiròfan amb pressió negativa i ventilació independent



SCOG



“Tweetable Abstract”

La histeroscòpia és un procediment diagnòstic i terapèutic ràpid i mínimament invasiu que es pot realitzar amb poc risc d'infecció durant la pandèmia de COVID-19 sempre que es prenguin les mesures preventives adients