



TUMORACIONS SACRES



*Dra. L. Martin, Dra. L. Torres, Dra. M. Jane, Dra. M. López,
Dra. M. Ballesteros, Dr. G. Albaigés, Dra. M. De la Flor
Hospital Joan XXIII Tarragona*




CAS 1









CAS 2

05

Fetal Head
Har-Alto
Pot 100 G
Gn -3
C8 / M7
P3 / E3
SRI II 4

1 D 33.94mm
2 D 19.78mm

DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL



20 SG

62



Fetal Head
Har-Alto
Pot 100 Q
Gn -3
C8 / M7
P3 / E3
SRI II 4

1 D 33.94mm
2 D 19.78mm

DESCRIPCIÓ ECOGRÀFICA



CLASSIFICACIÓ




Altman RP, Randolph JG, Lilly JR. eds. Sacrocoxygeal teratomas: American Academy of Pediatrics. Surgical Section Survey, 1973. *J Pediatr Surg* 1974; 9: 391-394.

20 SG




Pot 100 % 12cm/s
Gn -3
FMP 120 Hz
Áng.SV 0
Tam. 3.0mm
Frec Bajo
PRF 5.5kHz



Der. PS-ACM 21.65cm/s

Har-Alto
Pot 100 %
Gn -3
C8 / M7
P3 / E3
SRI II 4


Pot 100 %
Gn 10.6
Frec Bajo
Calid Norm
FMP Bajo1
PRF 0.9kHz



20 SG

GE


Fetal Head
Har-Bajo
Pot 100 G
Gn -11
C8 / M7
P3 / E3
SRI II 4




21 SG

63


Fetal Cardio
Har-Alto
Pot 100 %
Gn 0
C10 / M5
E2
SRI II 4 / CRI 2




24SG




27SG



33SG






37SG




33 SG

Fetal Cardio
Har-Medio
Pot 100 %
Gn -10
C10 / M5
E2
SRI II 4 / CRI 2





RMN
33SG



COMPLICACIONS

- ❑ **Efectes compresius:** obstrucció vesical o rectal, hidronefrosis...
- ❑ **Hydrops (25%):**
 - *Compresió vasos umbilicals
 - *Anemia fetal (hemorragia intratumoral)
 - *Fracàs cardíac alt gast (shunt arteriovenoso)
- ❑ **Part preterme (50%)**
- ❑ **Síndrome del mirall matern**
- ❑ **Hemorràgia o ruptura espontània**

TRACTAMENT




TRACTAMENT DEFINITIU:
EXÉRESIS POSTPART

Cesàrea electiva a les 38+5sg.

Teratoma sacrococcigi de 105 x 80mm

Previament es **va realitzar una punció i drenatge percutani ecoguiat** de 175cc.

- Disminueix el risc de distòcia
- Disminueix sangnat intratumoral
- Disminueix el risc de compressió estructures veïnes





5 mesos de vida

- AP: teratoma madur quístic
- Alfafetoproteína 270600ug/L a 60005ug/L
- Bufeta neurògena postIQ resolta
- RVU grau IV-V



TO TAKE HOME...

