

DISMINUCIÓ DE MOVIMENTS FETALS

- No percepció de MF a partir de la setmana 24
- Absència total i aguda de MF > 2 hores en una gestant que anteriorment els percebia
- Percepció subjectiva d'una DMF respecte el patró habitual > 12 hores
- Qualsevol percepció materna de DMF

Episodi de DMF

FACTORS CONFUSORS

- Activitat física materna important
- Angoixa i estrès matern
- Posició materna (bipedestació)
- Dejú perllongat i glicèmies baixes
- Hàbit tabàquic, alcohol i cafeïna
- Fàrmacs sedants i antidepressius
- Gestació < 24 setmanes
- Oligoamnis i polihidramnis
- Obesitat
- Placenta anterior
- Anèmia materna
- Son fetal

Anamnesi

- ✓ Antecedents mèdics i obstètrics
- ✓ Duració de l'episodi i símptomes
- ✓ Descartar factors confusió
- **Exploració física i ginecològica**
- **Exploracions complementàries**
 - NST: > 28 setmanes
 - Ecografia: PFE i màxima columna
 - Doppler amb PVS ACM

CAUSES

- **Hipòxia fetal**
 - Insuficiència placentària
 - Anèmia fetal
 - ✓ Isoimmunització
 - ✓ Hemorràgia feto-materna
- **Alteracions neuromusculars**

Troballa que NO requereixi finalització

Troballa que requereixi finalització

Informar motius de re-consulta

Finalització

Seguir protocol específic en funció de la troballa: CIR, Oligoamnis....

Control de benestar fetal 48-72 per nova valoració en:

- Pacients d'alt risc obstètric (protocol generalitat)
- Si es tracta d'un segon episodi de DMF