

# INFORME ECOGRAFIA SÒL PELVIÀ

## INDICACIÓ:

Exploració realitzada mitjançant sonda transvaginal multifreqüència i transductor convex 4D en temps real 2-8 MHz (transperineal)

## ECOGRAFIA GINECOLÒGICA:

- Úter en anteversió/retroversió/posició intermitja de dimensions longitudinal, anteroposterior i transversal de -- x – x – mm respectivament. Els seus contorns són regulars/irregulars i la ecodensitat homogènia/heterogènia .....
- Endometri de -- mm de gruix, sense/amb evidència de patologia.
- Ovari dret visible de dimensions -- x – mm d'aspecte normal / amb imatge quística....
- Ovari esquerre visible de dimensions -- x – mm d'aspecte normal / amb imatge quística....
- Fons de sac de Douglas sense líquid visible

## ECOGRAFIA SÒL PELVIÀ:

- Lliscament uretral: -- mm (segons valoració transperineal)
- Embudització coll vesical: si / no
- Imatges patològiques intravesicals: si / no
- Gruix detrusor: -- mm
- Volum orina residual: -- cc
  
- Múscul elevador de l'anús (retenció):
  - Íntegre
  - Avusió dreta/esq/ bilateral + complerta/parcial
- Àrea hiat urogenital (valsalva): -- cm<sup>2</sup>
  
- Definir prolapses:
  - Cistocele ecogràfic que sobrepassa -- mm la línia del pubis amb angle uretrovesical obert / conservat ("efecte Kinking")
  - Prolapse uterí: descens de cos uterí / elongació cervical
  - Rectocele ecogràfic que sobrepassa -- mm la línia del pubis amb/sense component d'enterocele ecogràfic

- Valoració de malla suburetral:
  - Malla suburetral situada a 1/3 proximal (coll vesical) / mig / distal (meat uretral) a -- mm de llum uretral i extrems de la malla amb trajecte simètric/asimètric (definir asimetria)
  - Forma de "C"/"plana" en repòs i "C"/"plana" en valsalva
  - Signes obstructius: no / si (S itàlica, malla en contacte amb paret uretral, disminució distància pubis-uretra)
  
- Valoració de malla prolapse:
  - Malla que ocupa completament / parcialment l'espai vesicovaginal i/o rectovaginal
  - Especificar si es troba arrugada i pèrdues d'anclatge apical o anterior

### **IMPRESSIÓ DIAGNÒSTICA:**

Hipermovilitat uretral.

Embudització coll vesical.

Residu postmiccional elevat.

MEA sense lesions o avulsió....

Ballooning lleu ( $25-29.9\text{cm}^2$ ) / moderat ( $30-34.9\text{cm}^2$ ) / notable ( $35-39.9\text{cm}^2$ ) / sever ( $>40\text{cm}^2$ ).

Cistocele / recto-rectoenterocele (...) ecogràfic.

Malla suburetral sense signes obstructius o amb signes obstructius.